


## Monitoraggio dell' Idrogeno Solforato (H<sub>2</sub>S ) con campionatori passivi Area Total



La Campagna di monitoraggio dell'idrogeno solforato (H<sub>2</sub>S), con l'utilizzo dei campionatori passivi (radielli), viene effettuata dal personale tecnico dell'Ufficio Aria del Dipartimento provinciale di Potenza, per verificare eventuali alterazioni della qualità dell'aria dovute all'immissione di H<sub>2</sub>S, nei comuni area Total.

Nei punti indicati in tabella relativa al periodo di esposizione : **dal 20/02/19 al 07/03/19**

I valori riscontrati, nei siti di misura, sono inferiori alla soglia di rilevabilità: **L.O.D.** ( 0,9 µg/m<sup>3</sup> )

Analisi a cura del Laboratorio Strumentale del Dipartimento Provinciale di Potenza .

| Tipologia Sito | Comune      | Ubicazione radiello              | Concentrazione rilevata (1) (µg/m <sup>3</sup> ) | L.O.D. Limite di rivelabilità |
|----------------|-------------|----------------------------------|--|-------------------------------|
| 1) Urbano      | Accettura   | Zona P.I.P.                      | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |
| 2) Urbano      | Stigliano   | Via Zanardelli                   | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |
| 3) Urbano      | Gorgoglione | Chiesa S.Domenico Savio          | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |
| 4) Rurale      | Corleto P.  | C/o abit. Laudisio (Tempa Rossa) | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |
| 5) Rurale      | Corleto P.  | Centro Oli dir. Pietrapertosa    | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |
| 6) Rurale      | Gorgoglione | C/o Pozzo GG2 (Tempa Rossa)      | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |
| 7) Rurale      | Corleto P.  | C/o abit. Petrini (Tempa Rossa)  | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |
| 8) Urbano      | Corleto P.  | Via Ariosto                      | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |
| 9) Urbano      | Guardia P.  | Via Serrone                      | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |
| 10) Rurale     | Laurenzana  | Strada SS.92 km 40.9             | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |

**1) Metodo di Prova :** metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri - IRCCS" H1 Ed.01/2006

**LINK:**

**L.O.D.** (Limit Of Detection) limite di rivelabilità

**Radiello**= campionatore passivo diffusivo a simmetria radiale per determinare le concentrazione di gas e o vapori aerodispersi.

**Campionatore passivo**= dispositivo in grado di raccogliere i gas e i vapori inquinanti presenti nell'aria senza far uso di aspirazione forzata. L'elevato grado di accuratezza e precisione dei campionatori passivi consente di realizzare mappature accurate della distribuzione media degli inquinanti in una data area, su periodi di osservazione medio-lunghi .

## Monitoraggio dell' Idrogeno Solforato (H<sub>2</sub>S ) con campionatori passivi Area Total



La Campagna di monitoraggio dell'idrogeno solforato (H<sub>2</sub>S), con l'utilizzo dei campionatori passivi (radielli), viene effettuata dal personale tecnico dell'Ufficio Aria del Dipartimento provinciale di Potenza, per verificare eventuali alterazioni della qualità dell'aria dovute all'immissione di H<sub>2</sub>S, nei comuni area Total.

Nei punti indicati in tabella relativa al periodo di esposizione : **dal 07/03/19 al 19/03/19**

I valori riscontrati, nei siti di misura, sono inferiori alla soglia di rilevabilità: **L.O.D.** ( 0,9 µg/m<sup>3</sup> )

Sito n. 9 Radiello non trovato in data 19/03/2019, a causa del cedimento del supporto del Radiello, molto probabilmente avvenuto per avverse condizioni meteo (forte vento).

Analisi a cura del Laboratorio Strumentale del Dipartimento Provinciale di Potenza .

| Tipologia Sito | Comune      | Ubicazione radiello              | Concentrazione rilevata (1) (µg/m <sup>3</sup> ) | L.O.D. Limite di rivelabilità |
|----------------|-------------|----------------------------------|--|-------------------------------|
| 1) Urbano      | Accettura   | Zona P.I.P.                      | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |
| 2) Urbano      | Stigliano   | Via Zanardelli                   | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |
| 3) Urbano      | Gorgoglione | Chiesa S.Domenico Savio          | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |
| 4) Rurale      | Corleto P.  | C/o abit. Laudisio (Tempa Rossa) | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |
| 5) Rurale      | Corleto P.  | Centro Oli dir. Pietrapertosa    | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |
| 6) Rurale      | Gorgoglione | C/o Pozzo GG2 (Tempa Rossa)      | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |
| 7) Rurale      | Corleto P.  | C/o abit. Petrini (Tempa Rossa)  | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |
| 8) Urbano      | Corleto P.  | Via Ariosto                      | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |
| 10) Rurale     | Laurenzana  | Strada SS.92 km 40.9             | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |

**1) Metodo di Prova :** metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri - IRCCS" H1 Ed.01/2006


**LINK:**

**L.O.D.** (Limit Of Detection) limite di rivelabilità

**Radiello**= campionatore passivo diffusivo a simmetria radiale per determinare le concentrazione di gas e o vapori aerodispersi.

**Campionatore passivo**= dispositivo in grado di raccogliere i gas e i vapori inquinanti presenti nell'aria senza far uso di aspirazione forzata. L'elevato grado di accuratezza e precisione dei campionatori passivi consente di realizzare mappature accurate della distribuzione media degli inquinanti in una data area, su periodi di osservazione medio-lunghi .

## Monitoraggio dell' Idrogeno Solforato (H<sub>2</sub>S ) con campionatori passivi Area Total



La Campagna di monitoraggio dell'idrogeno solforato (H<sub>2</sub>S), con l'utilizzo dei campionatori passivi (radielli), viene effettuata dal personale tecnico dell'Ufficio Aria del Dipartimento provinciale di Potenza, per verificare eventuali alterazioni della qualità dell'aria dovute all'immissione di H<sub>2</sub>S, nei comuni area Total.

Nei punti indicati in tabella relativa al periodo di esposizione : **dal 19/03/19 al 04/04/19**

I valori riscontrati, nei siti di misura, sono inferiori alla soglia di rilevabilità: **L.O.D.** ( 0,9 µg/m<sup>3</sup> )

Tranne nei Siti n° 3 e 4 dove si è misurato un valore rispettivamente di 1,0 µg/m<sup>3</sup> e 0,9 µg/m<sup>3</sup>, di poco superiore alla soglia di rilevabilità.

Analisi a cura del Laboratorio Strumentale del Dipartimento Provinciale di Potenza .

| Tipologia Sito | Comune      | Ubicazione radiello              | Concentrazione rilevata (1) (µg/m <sup>3</sup> ) | L.O.D. Limite di rivelabilità |
|----------------|-------------|----------------------------------|--|-------------------------------|
| 1) Urbano      | Accettura   | Zona P.I.P.                      | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |
| 2) Urbano      | Stigliano   | Via Zanardelli                   | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |
| 3) Urbano      | Gorgoglione | Chiesa S.Domenico Savio          | 1,0  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |
| 4) Rurale      | Corleto P.  | C/o abit. Laudisio (Tempa Rossa) | 0,9  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |
| 5) Rurale      | Corleto P.  | Centro Oli dir. Pietrapertosa    | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |
| 6) Rurale      | Gorgoglione | C/o Pozzo GG2 (Tempa Rossa)      | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |
| 7) Rurale      | Corleto P.  | C/o abit. Petrini (Tempa Rossa)  | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |
| 8) Urbano      | Corleto P.  | Via Ariosto                      | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |
| 9) Urbano      | Guardia P.  | Via Serrone                      | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |
| 10) Rurale     | Laurenzana  | Strada SS.92 km 40.9             | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |

**1) Metodo di Prova :** metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri - IRCCS" H1 Ed.01/2006

**LINK:**

**L.O.D.** (Limit Of Detection) limite di rivelabilità

**Radiello**= campionatore passivo diffusivo a simmetria radiale per determinare le concentrazione di gas e o vapori aerodispersi.

**Campionatore passivo**= dispositivo in grado di raccogliere i gas e i vapori inquinanti presenti nell'aria senza far uso di aspirazione forzata. L'elevato grado di accuratezza e precisione dei campionatori passivi consente di realizzare mappature accurate della distribuzione media degli inquinanti in una data area, su periodi di osservazione medio-lunghi .

## Monitoraggio dell' Idrogeno Solforato (H<sub>2</sub>S ) con campionatori passivi Area Total



La Campagna di monitoraggio dell'idrogeno solforato (H<sub>2</sub>S), con l'utilizzo dei campionatori passivi (radielli), viene effettuata dal personale tecnico dell'Ufficio Aria del Dipartimento provinciale di Potenza, per verificare eventuali alterazioni della qualità dell'aria dovute all'immissione di H<sub>2</sub>S, nei comuni area Total.

Nei punti indicati in tabella relativa al periodo di esposizione : **dal 04/04/19 al 18/04/19**

I valori riscontrati, nei siti di misura, sono inferiori alla soglia di rilevabilità: **L.O.D.** ( 0,9 µg/m<sup>3</sup> )

Analisi a cura del Laboratorio Strumentale del Dipartimento Provinciale di Potenza .

| Tipologia Sito | Comune      | Ubicazione radiello              | Concentrazione rilevata (1) (µg/m <sup>3</sup> ) | L.O.D. Limite di rivelabilità |
|----------------|-------------|----------------------------------|--|-------------------------------|
| 1) Urbano      | Accettura   | Zona P.I.P.                      | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |
| 2) Urbano      | Stigliano   | Via Zanardelli                   | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |
| 3) Urbano      | Gorgoglione | Chiesa S.Domenico Savio          | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |
| 4) Rurale      | Corleto P.  | C/o abit. Laudisio (Tempa Rossa) | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |
| 5) Rurale      | Corleto P.  | Centro Oli dir. Pietrapertosa    | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |
| 6) Rurale      | Gorgoglione | C/o Pozzo GG2 (Tempa Rossa)      | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |
| 7) Rurale      | Corleto P.  | C/o abit. Petrini (Tempa Rossa)  | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |
| 8) Urbano      | Corleto P.  | Via Ariosto                      | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |
| 9) Urbano      | Guardia P.  | Via Serrone                      | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |
| 10) Rurale     | Laurenzana  | Strada SS.92 km 40.9             | <L.O.D.  | 0,9 µg/m <sup>3</sup>         |

**1) Metodo di Prova :** metodo interno "Fondazione Salvatore Maugeri - IRCCS" H1 Ed.01/2006

**LINK:**

**L.O.D.** (Limit Of Detection) limite di rivelabilità

**Radiello**= campionatore passivo diffusivo a simmetria radiale per determinare le concentrazione di gas e o vapori aerodispersi.

**Campionatore passivo**= dispositivo in grado di raccogliere i gas e i vapori inquinanti presenti nell'aria senza far uso di aspirazione forzata. L'elevato grado di accuratezza e precisione dei campionatori passivi consente di realizzare mappature accurate della distribuzione media degli inquinanti in una data area, su periodi di osservazione medio-lunghi .

## **Note e Norme di riferimento:**

In riferimento al solfuro di idrogeno, all'acido solfidrico o idrogeno solforato (H<sub>2</sub>S), la normativa non prevede alcun valore limite. I riferimenti possono essere pertanto sia i valori indicati dall'ormai abrogato DPR 322/71 e sia i valori guida e la soglia olfattiva pubblicati dall'OMS. Su lungo termine altri possibili riferimenti potrebbero essere quelli del CICAD 53 pubblicati dall'IPCS (International Programme on Chemical Safety) nel 2003 e sia le Norme tecniche ed azioni per la tutela della qualità dell'aria nei Comuni di Viggiano e Grumento N. ex D.G.R. n. 983 del 6/8/13 della Regione Basilicata. L'acido solfidrico H<sub>2</sub>S è un gas incolore dall'odore caratteristico di uova marce, per questo definito gas putrido. È idrosolubile ha caratteristiche debolmente acide e riducenti. Il composto è caratterizzato da una soglia olfattiva decisamente bassa. È una sostanza estremamente tossica poiché è irritante e asfissiante. L'azione irritante, che si esplica a concentrazioni superiori ai 15.000 µg/m<sup>3</sup> ha come bersaglio le mucose, soprattutto agli occhi; a concentrazioni di 715.000 µg/m<sup>3</sup>, per inalazione, può causare la morte anche in 5 minuti (WHO 1981, Canadian Centre for Occupational Health and Safety 2001). Organizzazione Mondiale della Sanità (rif."Air Quality Guideline for Europe" 2nd Edition - 2000): Il valore guida contro gli odori molesti fissato è **7 µg/m<sup>3</sup>** – mediato su un periodo di 30 minuti di esposizione, e la soglia di **150 µg/m<sup>3</sup>** come media giornaliera.

**DPR 322/71 (abrogato)** Valore limite da non superare:

concentrazioni medie : **40 µg/m<sup>3</sup> (0,03 ppm)** su 24 h;

concentrazioni di punta : **100 µg/m<sup>3</sup> (0,07 ppm)** per 30 minuti (con frequenza pari ad 1 in otto ore).

CICADs – Concise International Chemical Assessment Document 53 dell'IPCS- Internat. Programme on Chemical Safety:

concentrazioni a breve termine : **100 µg/m<sup>3</sup>** (esposizione di durata da 1 a 14 giorni);

concentrazione a medio termine: **20 µg/m<sup>3</sup>** (esposizione di durata da 1 a 90 giorni)

Norme tecniche ed azioni per la tutela della qualità dell'aria nei Comuni di Viggiano e Grumento N. ex D.G.R. n. 983 del 6/8/13 della Regione Basilicata per il controllo della qualità dell'aria;valore limite giornaliero **32 µg/m<sup>3</sup>** .

*Il Dirigente*  
*Dott. Bruno Bove*